

טבלת השוואה בין תכשירי ברזל הרשומים בישראל*

דרך מתן	תוך-ורידִי					פומי, טבליות						פומי, סירופ/טיפות					
שם מסחרי	Ferrinemia	Ferinject	Ferrovin	Ferric Teva	Venofer	Foliron	Ferrifol	Foric pregnancy	Forol	Folex 400	Tardyferon	Ferrocal	Ferro 15	Tiptipot Ferripel-3	Iron Care	Ferripel-3 syrup	Hemafer
סוג הברזל	Iron III (as Iron III Hydroxide Polymaltose Complex)	Iron (as ferric carboxymaltose)	Iron as Iron Sucrose (Iron III Hydroxide Sucrose Complex)	Iron (as ferric carboxymaltose)	Ferrous (as Iron III Hydroxide Sucrose Complex)	Iron sucrose (as Iron III Hydroxide Sucrose Complex)	Iron (as Iron III Hydroxide Polymaltose Complex)	Ferrous Iron (as ferrous fumarate)	Ferrous fumarate	Ferrous Iron (as ferrous fumarate)	Ferrous iron (as ferrous sulfate dried)	Ferrous citrate monohydrate	Ferrous gluconate	Iron (as Iron III Hydroxide Polymaltose Complex)	Iron sucrose (as Iron III Hydroxide Sucrose Complex)	Iron (as Iron III Hydroxide Polymaltose Complex)	Iron (as Iron III Hydroxide Polymaltose Complex)
חומרים פעילים נוספים						Folic acid 0.4 mg	Folic acid 0.4 mg	Folic acid 0.4 mg	Folic acid 0.4 mg	Folic acid 0.4 mg		Calcium citrate 249 mg					
מינון ברזל	100 מ"ג/5 מ"ל	1,800 מ"ג/10 מ"ל (שווה ערך ל-500 מ"ג ברזל ב-10 מ"ל)	20 מ"ג/מ"ל	50 מ"ג/מ"ל	100 מ"ג/5 מ"ל	100 מ"ג	100 מ"ג	100 מ"ג	100 מ"ג	100 מ"ג	247.25 מ"ג ברזל סולפאט (שווה ערך ל-80 מ"ג ברזל)	246 מ"ג (שווה ערך ל-52 מ"ג ברזל)	130 מ"ג/5 מ"ל (שווה-ערך ל-15 מ"ג של Fe ⁺⁺)	50 מ"ג/5 מ"ל (2.5 מ"ג ברזל בטיפה)	50 מ"ג/5 מ"ל	50 מ"ג/5 מ"ל	50 מ"ג/מ"ל (2.5 מ"ג ברזל בטיפה)
צורת מתן	תמיסה להזרקה	תמיסה להזרקה	תמיסה להזרקה	תמיסה להזרקה	תמיסה להזרקה	טבליות	טבליות	טבליות	טבליות	טבליות	טבליות	טבליות	סירופ	טיפות לבליעה	סירופ	סירופ	טיפות לבליעה
הנחיות מיוחדות לנטילה (כתישה / נטילה ביחס למזון)						• ניתן ללעיסה או מיד לאחר הארוחה	• ניתן ללעיסה או מיד לאחר הארוחה	• יש לבלוע את התרופה עם כוס מים.	• יש לבלוע את התרופה עם כוס מים.	• יש לבלוע את התרופה עם כוס מים.	• יש לבלוע את התרופה עם כוס מים.	• רצוי ליטול את התרופה בשלמותה, ללא מזון, עם מים או מיץ פירות.	מומלץ ליטול על קיבה ריקה, אלא אם ישנן תופעות לוואי במערכת העיכול	• ניתן לערבב עם מיצי פירות וירקות או מזון תינוקות	• ניתן לערבב עם מיצי פירות וירקות או מזון תינוקות	• ניתן לערבב עם מיצי פירות וירקות או מזון תינוקות	• יש ליטול את התרופה במהלך או אחרי הארוחה
מרכיבים בלתי-פעילים חשובים	Sodium (0.2 mg/mL)	Sodium (5.5 mg/mL)		Sodium (amount depends on volume of vial)	Sodium (7 mg/mL)	מניטול (368 מ"ג בטבליה)	אספרטיים (1.5 מ"ג בטבליה)	לקטוז (כ-75 מ"ג בטבליה)	לקטוז (כ-75 מ"ג בטבליה)	לקטוז (כ-75 מ"ג בטבליה)		לקטוז	דקסטרוז (500 מ"ג ב-5 מ"ל), סוכרוז (2,500 מ"ג ב-5 מ"ל), מתילהידרוקסיבנזואט, פרופילפרבן	סוכרוז (50 מ"ג/מ"ל), סודיום מתילהידרוקסיבנזואט, סודיום פרופילהידרוקסיבנזואט	סוכרוז (2,500 מ"ג ב-5 מ"ל), סוכרוז (750 מ"ג ב-5 מ"ל), מתילהידרוקסיבנזואט, פרופילהידרוקסיבנזואט	סוכרוז (1,000 מ"ג ב-5 מ"ל), סוכרוז (2,000 מ"ג ב-5 מ"ל), אתנול (96% 15.6 מ"ג ב-5 מ"ל), מתילהידרוקסיבנזואט, פרופילהידרוקסיבנזואט	סוכרוז (50 מ"ג/מ"ל), מתילפרבן, פרופילפרבן, פוליסורבאט 80, תמצית לימון
תאריך עדכון עלון באתר משרד הבריאות	11/2022	3/2024	3/2024	11/2024	01/2022	1/2019	12/2020	3/2024	10/2015	3/2024	4/2024	9/2023	7/2014	12/2024	6/2019	12/2021	11/2017

* כל המידע בטבלה זו לקוח מעלוני התכשירים כפי שמופיעים במאגר התרופות של משרד הבריאות. תאריכי העדכון של העלון של כל תכשיר מצויינים בשורה האחרונה של הטבלה.